

## Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vet. für Kaninchen

### Myxomatosevirus und Rabbit-Haemorrhagic-Disease-Virus (RHD)

#### Grundimmunisierung:

Im Alter von 4 – 6 Wochen Myxomatose, RHD

4 Wochen später Myxomatose, RHD

#### Auffrischung

alle 6 Monate: Myxomatose (in Endemiegebieten u. U. alle 4 Monate)

alle 12 Monate: RHD (Häsinnen in intensiver Zuchtnutzung sollten in kürzeren Intervallen - alle 6 Monate - geimpft werden.)

---

### *Pasteurella multocida* / *Bordetella bronchiseptica*

- Vor allem als Bestandsimpfung in Kaninchenzuchten.
- Es ist zurzeit in Deutschland ausschließlich ein inaktivierter *P. multocida* und *B. bronchiseptica*-Kombinationsimpfstoff erhältlich, der subkutan verabreicht wird (enthält *P. m.* Serovar A, *P. m.* Serovar D-Toxoid und *B. br.*).
- Indikation: Durch regelmäßige Wiederholungsimpfungen soll in Verbindung mit geeigneten veterinärhygienischen Maßnahmen eine Reduktion des Infektionsdrucks im Bestand erzielt werden.
- **Grundimmunisierung:** 2 x im Abstand von 14 Tagen ab dem 28. Lebenstag
- **Wiederholungsimpfungen:** Alle 6 Monate; bei intensiv zur Zucht genutzten Häsinnen mindestens vor jeder 2. Trächtigkeit.